

H2 - GLUCOSIO BREATH TEST

Test per la determinazione della sovracrescita batterica nell' intestino Tenue/ piccolo intestino (SIBO: small intestine bacterial overgrowth)

Preparazione del paziente:

Per la massima attendibilità del test

- Il giorno precedente il test il paziente deve evitare fibre e carboidrati complessi quali quelli contenuti in frutta, verdure pane e pasta. In particolare la sera precedente è raccomandabile una cena leggera; evitare caramelle chewinggum e alcolici.
- Il paziente deve essere a digiuno da un minimo di 10 ore, può bere solo acqua non gasata.
- Il paziente non deve fumare, ne dormire, ne fare esercizio fisico intenso per almeno mezz'ora prima del test.
- Il paziente deve Informare il medico se ha fatto recentemente terapia antibiotica e/o ha avuto recentemente diarrea, perché queste condizioni possono avere conseguenze sul risultato del test. Il paziente non dovrebbe assumere farmaci fin dalla sera precedente.
- H2-BREATH TEST deve essere eseguito almeno quattro settimane dopo la terapia con antibiotici, lavaggio Intestinale o enteroscopia e almeno una settimana dopo sospensione dell'uso di lassativi.

Esecuzione del test

L'analisi prevede un prelievo di espirato subito prima della somministrazione del substrato (tempo 0) e ogni 20 minuti nelle due ore successive.

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE